

1 養殖概況

現在、8~9回目の摘採が行われています。ノリ網は3割程度撤去されています。

2 海況（1日満潮時・右表）

水温：平均10.1℃と、平年より0.2℃低めでした。

比重：平均23.2でした。

栄養塩：平均2.1マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は珪藻（スケルトネマ等）、動物でした。

3 ノリの病害、生長など（1日調査）

- ・色落ちは11調査点で確認され、中度5点、軽度6点でした。
- ・アカは9調査点で確認され、重度3点、軽度6点でした。
- ・ツボは13調査点で確認され、重度が9点、中度が2点、軽度が2点でした。

4 今後の管理

- ・ノリの切り流しは絶対に行わないでください。
 - ・生産を継続する網は速やかに摘採し、活性処理を行ってください。生産不能な網は撤去を進めてください。
 - ・活性処理を行う場合は、必要最低限の使用としてください。
- なお、200倍程度を目安とし、残液は必ず再利用を行ってください。

3月1日（旧暦29日）の海況

| 漁場名 | 調査点 | 水温 (°C) | 比重 | 栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$) | プランクトン (cc/100L) | アカ | ツボ | 色落ち | 葉長 (cm) |
|--------|-----|---------|------|--|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 4号 | 1 | 10.1 | 18.3 | 17.9 | 0.5 | ● | ★ | ○ | 20 |
| 6(2)号 | 12 | 9.8 | 23.5 | 0.0 | - | ○ | ★ | ● | 25 |
| 七つはげ | 11 | 10.0 | 23.6 | 0.0 | 1.3 | ○ | ★ | ○ | 2 |
| よりあわせ | A | 10.1 | 20.5 | 9.4 | - | ★ | ★ | ○ | 2 |
| えどなかつ | 2 | 10.3 | 23.1 | 1.5 | - | ● | ★ | ● | 8 |
| にしのつ | 3 | 10.2 | 22.7 | 0.9 | 0.6 | ○ | ▲ | ● | 14 |
| たかつ | 4 | 9.9 | 23.3 | 0.0 | - | ○ | ★ | ▲ | 10 |
| せいどまり | B | 10.0 | 23.3 | 0.0 | 2.0 | ★ | ★ | ▲ | 2 |
| 13号 | 10 | 10.1 | 23.8 | 0.7 | - | ● | ★ | ▲ | 12 |
| 20号 | 9 | 10.2 | 23.8 | 0.2 | 0.6 | - | - | - | - |
| 24号 | 8 | 10.3 | 23.6 | 0.4 | - | ○ | ▲ | ▲ | 20 |
| ひゃっかん | 5 | 9.8 | 23.4 | 0.2 | 1.5 | - | - | - | - |
| 22(1)号 | 6 | 9.9 | 23.7 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 25号 | 7 | 9.9 | 23.7 | 0.0 | 0.4 | ★ | ★ | ▲ | 10 |
| 33号 | 16 | 10.2 | 24.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| 43号 | 13 | 10.4 | 24.0 | 0.0 | 0.2 | ● | ● | ● | 8 |
| 43号 | 14 | 10.5 | 23.5 | 8.1 | - | ○ | ● | ○ | 8 |
| 44号 | 15 | 10.4 | 24.2 | 0.0 | 0.3 | ● | ○ | ● | 20 |
| 45号 | C | 10.5 | 24.2 | 0.1 | - | ● | ○ | ● | 22 |
| 平均 | | 10.1 | 23.2 | 2.1 | 0.8 | 9/15地点 | 13/15地点 | 11/15地点 | 12 |

アカ・ツボの感染、色落ちの程度：○なし、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です

福岡県海況情報が「うみえる福岡」としてリニューアル!

HP アドレスは、umiel-fukuoka.jp

