

ノリ養殖情報 第31号

令和8年3月18日（出庫64日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

網の撤去作業が進行し、1割弱の漁場で生産が継続されています。

2 海況（18日満潮時・右表）

水温：平均12.9℃と、平年より1.0℃高めでした。

比重：平均23.6でした。

栄養塩：平均1.3マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は夜光虫、珪藻（コシテイスカス、キートロ等）でした。

3 ノリの病害、生長など（18日調査）

- ・アカは4調査点で確認され、軽度が3点、中度が1点でした。
- ・アカの病斑は、顕微鏡サイズと肉眼サイズでした。
- ・色落ちは6調査点で確認され、すべて重度でした。
- ・調査点12は出庫直後でノリが小さいため、色調は測定できませんでした。
- ・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・この先、気温が高めで曇りがちの予報となっており、アカが重症化する恐れがあります。計画的に摘採を進めるとともに、活性処理を行ってください。
- ・網の高さはハラで2.5m以上を維持してください。
- ・活性処理は200倍を目安として行い、必ず再利用してください。
- ・生産不能な網は撤去してください。
- ・ノリの切り流しは厳禁です。底質の悪化につながります。

次回の調査は3月23日（月）の予定です。

3月18日（旧暦30日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	12.9	21.3	8.2	3.4	—	—	—
6(2)号	12	12.7	23.6	0.2	—	○	—	7
七つはぜ	11	12.7	23.7	0.0	5.6	●	★	5
よりあわせ	A	13.4	22.2	0.7	—	—	—	—
えどなかつ	2	13.0	23.7	0.3	—	—	—	—
にしのおつ	3	13.1	23.1	0.2	4.4	—	—	—
たかつ	4	12.7	23.6	0.0	—	—	—	—
せいどまり	B	12.9	23.5	0.5	7.0	—	—	—
13号	10	13.0	24.0	1.3	—	—	—	—
20号	9	12.9	24.0	0.0	4.1	▲	★	25
24号	8	12.7	23.9	0.9	—	●	★	10
ひやっかん	5	12.8	23.7	0.0	12.7	—	—	—
22(1)号	6	12.7	23.6	0.0	—	—	—	—
25号	7	12.8	24.0	0.3	7.0	—	—	—
33号	16	12.8	24.1	3.1	—	○	★	10
43号	13	12.9	24.1	0.5	4.8	—	—	—
43号	14	13.1	23.6	8.9	—	○	★	10
44号	15	13.0	24.1	0.0	3.3	●	★	15
45号	C	13.1	24.1	0.4	—	—	—	—
平均		12.9	23.6	1.3	5.8	4/7地点	6/6地点	12

アカの感染、色落ちの程度：○感染なし又は良好、●軽度

▲中度、★重度または大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です