

1 養殖概況

現在、7 回目の摘採が行われています。

一部の漁場で、冷凍網が出庫されています。

全体で 6～7 割程度の網が撤去されています。

2 海況 (25 日満潮時・右表)

水 温：平均 14.2℃と、平年より 1.6℃高めでした。

比 重：平均 20.2 でした。

栄養塩：平均 10.0 マイクロ (μg・at/L) でした。

プランクトン：種類は渦鞭毛藻 (プロトゾイティウム)、動物でした。

3 ノリの病害など (25 日調査・右表)

・アカは 8 調査点で確認され、軽度が 2 点、中度が 1 点、
重度が 5 点でした。

・ツボは 3 調査点で確認され、すべて重度でした。

・色落ちは 12 調査点で確認され、中度が 1 点、重度が 11 点
でした。

4 今後の管理

・アカが重症化しています。今後も雨が続く予報になっており、
生産不能にならないよう管理を怠らないでください。

・網の高さはハラで 2.5m (吊り口 2.8m) 以上を維持して
ください。

・摘採可能な網は速やかに摘採し、活性処理を行ってください。

・生産不能な網は撤去してください。

・ノリの切流しは絶対に行わないでください。

・次回は 3 月 28 日 (木) に情報を発行予定です。

3 月 25 日 (旧暦 16 日) の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 (μg・at/L)	プランクトン (cc/100L)	アカ	ツボ	色落ち	葉長 (cm)
4 号	1	14.6	9.9	40.0	0.4	●	★	★	17
6 (2) 号	1 2	14.4	15.6	23.1	-	○	○	★	22
七つはげ	1 1	14.4	17.8	9.7	0.4	★	○	★	17
よりあわせ	A	14.3	16.8	15.4	-	○	★	▲	10
えどなかつ	2	14.2	20.8	5.2	-	○	○	○	4
にしのつ	3	14.2	20.6	3.8	0.8	○	★	★	12
たかつ	4	14.3	19.9	7.6	-	-	-	-	-
せいどまり	B	14.2	20.6	7.3	0.6	★	○	★	3
1 3 号	1 0	14.4	22.9	8.4	-	★	○	★	20
2 0 号	9	14.3	19.5	8.9	0.4	○	○	★	3
2 4 号	8	14.6	15.6	29.1	-	★	○	★	4
ひゃっかん	5	14.1	21.5	4.6	0.6	-	-	-	-
2 2 (1) 号	6	13.9	23.9	1.1	-	-	-	-	-
2 5 号	7	14.0	23.5	1.1	0.7	●	○	★	20
3 3 号	1 6	13.9	24.4	1.3	-	-	-	-	-
4 3 号	1 3	14.0	23.5	2.3	0.3	▲	○	★	15
4 3 号	1 4	14.4	21.5	8.7	-	-	-	-	-
4 4 号	1 5	14.0	23.8	2.2	0.3	★	○	★	4
4 5 号	C	14.2	21.7	10.3	-	-	-	-	-
平均		14.2	20.2	10.0	0.5	8/13地点	3/13地点	12/13地点	12

アカ・ツボの感染、色落ちの程度：○感染なしまたは良好、●軽度、▲中度、★重度または大量感染

※プランクトン沈殿量は速報値です。

うみえる福岡



umiel-fukuoka.jp