

・摘採を急いでください！！

12月5日（旧暦5日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 (µg·at/L)	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	14.2	16.6	22.3	0.7	○	○	35
6(2)号	12	16.0	22.4	1.0	-	○	○	35
七つはぜ	11	15.9	22.0	1.8	2.9	○	●	7
よりあわせ	A	14.2	18.4	17.1	-	○	○	22
えどなかつ	2	15.1	21.6	4.7	-	○	○	45
にしのつ	3	15.1	21.2	5.2	0.8	○	○	5
たかつ	4	14.9	20.9	5.6	-	○	●	8
せいどまり	B	15.1	21.2	5.1	1.1	○	○	7
13号	10	15.6	21.9	1.6	-	○	●	28
20号	9	16.0	22.6	0.6	1.2	○	○	13
24号	8	15.9	22.4	1.3	-	○	●	23
ひゃっかん	5	15.8	22.1	2.0	1.7	○	●	40
22(1)号	6	16.0	22.3	1.3	-	○	●	8
25号	7	16.1	22.5	1.0	0.9	●	▲	15
33号	16	16.1	22.5	1.1	-	●	●	8
43号	13	16.1	22.7	1.1	0.9	○	▲	30
43号	14	16.0	22.7	1.0	-	○	●	7
44号	15	16.1	22.7	1.2	1.2	○	●	40
45号	C	16.1	22.7	1.2	-	○	▲	27
平均		15.6	21.6	4.0	1.2	2/19地点	12/19地点	21

1 養殖概況

- ・現在、2回目の摘採が行われています。

2 海況（5日満潮時・右表）

水温：平均15.6℃と、平年より1.5℃高めでした。

比重：平均21.6でした。

栄養塩：平均4.0マイクロ（µg·at/L）でした。

プランクトン：主な種類は、夜光虫、珪藻（キトコ入）でした。

3 ノリの生長（5日調査・右表）

- ・アカは2調査点で確認され、いずれも軽度（顕微鏡サイズ）でした。
- ・ツボは確認されませんでした。
- ・ヒアカは15調査点で確認されました。
- ・色落ちは12調査点で確認され、軽度が9点、中度が3点でした。

4 今後の管理

- ・栄養塩が減少し、色落ちが発生しました。今後色落ちの進行が予想されます。摘採を急いでください。
- ・網の高さはハラで2.2m（吊り口2.5m）以上を目安とし、ノリの生長や乾き具合に応じて調整してください。

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの感染、色落ちの程度：○感染なし又は良好、●軽度、▲中度