

ノリ養殖情報 第4号

令和7年11月17日（採苗13日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

- ・現在、大割展開、網洗いが行われています。
- ・研究所持ち込みの網糸で、色調の低下（軽度）を確認しました。

2 海況（17日満潮後2時間・右表）

水 温：平均18.0℃と、平年より0.8℃高めでした。
比 重：平均22.6でした。
栄養塩：平均4.2マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$ ）でした。
プランクトン：主な種類は、珪藻（*シノゲイカス*）でした。

3 ノリ芽検診の結果（14日研究連合会：網糸117本）

- ・最大葉長は0.6mm、最大葉長の平均は0.4mmと平年並でした。
- ・色調は全て正常でした。
- ・二次芽は、「普通」が2%、「少ない」が67%、「なし」が31%でした。
- ・アオノリは、「なし」が97%、「少ない」が3%でした。
- ・芽イタミは、「なし」が64%、「軽症」が30%、「中症」が6%でした。
- ・症状は、「死細胞」が65%、「くびれ」が35%でした。

4 今後の管理

- ・栄養塩の少ない状態が続いています。展開は岸寄り漁場から行い、今後の栄養塩情報を参考にしながら進めてください。
- ・二次芽の着生促進と健全な冷凍網の入庫に向け、適度な干出、網洗いを行ってください。
- ・干出時間は、昼間の干潮で2～3時間を目安としてください。
- ・網の水位は22日まではハラで1.7m、23日以降はハラで2.0mを目安とし、潮の引き具合、重ね枚数、天候等に応じて調節してください。
- ・11月18日(火)に、研究連合会が本日実施した干潮時の栄養塩調査情報を発行予定です。
- ・次回の調査は11月19日(水)に行う予定です。

11月17日（旧暦28日）の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	16.3	19.7	16.1	0.4
6(2)号	12	17.6	21.8	5.2	-
七つはげ	11	18.3	23.2	3.5	0.7
よりあわせ	A	17.3	21.1	7.0	-
えどなかつ	2	17.8	21.9	3.6	-
にしのつ	3	18.1	22.5	2.4	0.8
たかつ	4	17.9	22.6	2.6	-
せいどまり	B	18.2	22.6	3.0	0.9
13号	10	17.7	22.6	1.9	-
20号	9	17.8	22.6	1.9	0.6
24号	8	17.5	22.2	2.5	-
ひゃっかん	5	18.2	23.0	3.3	0.5
22(1)号	6	18.3	23.4	2.3	-
25号	7	18.3	23.2	3.9	0.7
33号	16	18.5	23.4	2.9	-
43号	13	18.5	23.5	3.6	0.7
43号	14	18.3	22.7	8.5	-
44号	15	18.6	23.6	3.1	0.7
45号	C	18.4	23.3	2.9	-
平 均		18.0	22.6	4.2	0.7

※プランクトン沈殿量は速報値です