

ノリ養殖情報 第5号

令和7年11月21日（採苗17日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

- ・漁場全域で網の展開作業が行われています。

2 海況（21日満潮時・右表）

水温：平均16.6℃と、平年より0.6℃高めでした。

比重：平均22.1でした。

栄養塩：平均5.5マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、珪藻（*コシノガイ*）でした。

3 ノリ芽検診の結果（21日研究連合会：網糸43本）

- ・最大葉長は5mm、最大葉長の平均は3.1mmと平年よりやや短めでした。
- ・色調は、ほとんどが正常でしたが、一部でやや低下したものがみられました。
- ・二次芽は、「厚い」が9%、「普通」が37%、「少ない」が42%、「なし」が12%でした。
- ・芽イタミは、「なし」が42%、「軽症」が49%、「中症」が9%でした。
- ・症状は、「死細胞」が82%、「くびれ」が18%でした。

4 今後の管理

- ・栄養塩が少ない状況が継続しており、小潮時に沖合で減少する可能性があります。
- ・栄養塩が減少した場合、岸寄り漁場への網の移動を検討してください。
- ・栄養塩がさらに減少した場合に備えて、葉長10ミリ程度での入庫を想定した準備をしてください。
- ・網の水位はハラで1.7mを目安とし、潮の引き具合、天候等に応じて調節してください。

【活性処理について】

- ・アオノリの着生が認められるノリ網に対して行ってください。
- ・処理液は再利用を行い、廃液は必ず陸上で処分してください。
- ・海上への投棄は厳禁です。

- ・次回の調査は11月24日(月)に行う予定です。

11月21日（旧暦2日）の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	15.1	20.6	28.1	0.7
6(2)号	12	17.0	20.4	3.1	-
七つはげ	11	16.6	21.9	3.7	0.7
よりあわせ	A	15.2	20.3	14.4	-
えどなかつ	2	15.9	21.3	5.0	-
にしのつ	3	16.2	22.2	4.6	1.1
たかつ	4	16.1	22.3	4.5	-
せいどまり	B	16.7	22.4	3.1	0.9
13号	10	16.6	21.7	6.9	-
20号	9	16.8	22.1	4.1	0.7
24号	8	16.7	22.1	4.8	-
ひやつかん	5	16.6	22.9	3.3	1.1
22(1)号	6	16.9	23.2	3.0	-
25号	7	16.9	22.2	2.8	0.8
33号	16	17.1	23.1	2.4	-
43号	13	17.1	22.4	2.5	0.7
43号	14	16.9	22.2	2.9	-
44号	15	17.0	23.5	2.5	0.8
45号	C	17.1	23.1	2.4	-
平均		16.6	22.1	5.5	0.8

※プランクトン沈殿量は速報値です