

ノリ養殖情報 第37号

令和7年3月4日（採苗137日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

- ・現在、2～3回目の摘採が行われています。

2 海況（4日満潮時・右表）

水 温：平均10.8℃と、平年より0.2℃低めでした。

比 重：平均22.6でした。

栄養塩：平均2.3マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、珪藻（1-カピア、キト如等）でした。

3 ノリの病害など（4日調査・右表）

- ・アカは6調査点で確認され、重度が1点、軽度が5点でした。
- ・色落ちは18調査点で確認され、重度が15点、中度が1点、軽度が2点でした。
- ・ヒアカは1調査点で確認されました。
- ・ツボは確認されませんでした。

4 今後の管理

- ・アカの感染が拡大しています。昇温期かつ降雨で比重が低下しているため、アカが重症化しやすい状況です。
週末のカラマで生産不能にならないよう、計画的に摘採を進め、活性処理を行ってください。
- ・活性処理を行う場合は、処理液の再利用を行い、廃液は必ず陸上で処分してください。海上への投棄は厳禁です。

3月4日（旧暦5日）の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	10.6	18.7	13.1	3.4	○	★	30
6（2）号	12	10.7	23.4	0.2	-	★	★	20
七つはげ	11	10.7	23.3	0.2	8.5	○	★	18
よりあわせ	A	10.9	18.8	9.4	-	○	★	25
えどなかつ	2	10.8	21.9	2.7	-	○	★	20
にしのつ	3	10.8	21.4	3.8	8.0	○	★	8
たかつ	4	10.7	22.8	0.6	-	○	★	18
せいどまり	B	10.8	22.5	1.0	12.8	○	★	25
13号	10	10.7	23.4	0.7	-	○	★	18
20号	9	10.9	23.4	0.5	3.8	●	★	25
24号	8	10.9	23.3	0.4	-	●	★	35
ひゃっかん	5	10.7	23.5	0.1	4.7	○	★	22
22(1)号	6	10.9	23.4	0.0	-	-	-	-
25号	7	10.9	23.5	0.0	3.8	●	★	12
33号	16	11.0	23.4	0.0	-	○	★	13
43号	13	11.1	23.6	0.0	3.8	○	★	30
43号	14	11.0	22.4	8.2	-	●	●	23
44号	15	11.0	23.6	2.8	4.4	●	▲	15
45号	C	10.9	23.5	0.0	-	○	●	7
平 均		10.8	22.6	2.3	5.9	6/18地点	18/18地点	20

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの感染、色落ちの程度：○感染なし又は良好、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染