

ノリ養殖情報 第2号

令和4年10月17日
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 採苗前日の注意点

ラッカサンにカキ殻を入れる際は、カキ殻の乾燥と地面の温度に注意してください。

2 採苗時の管理

- ・網の水位は、ハラで1.2mを目安としてください。
- ・漁場によっては、低張りをすると比重の低い海水に浸かるため、タネがつきにくくなる恐れがあります。過度な低張りはしないでください。
- ・タネは午前10時頃まで付きます。芽数を判断する網糸は、午前10時以降に切ったものを使用してください。
- ・芽付きは、網糸1cmあたり35~50個が適正です。
(蛍光100倍1視野当たり、新型顕微鏡は7~10個、旧型顕微鏡は5~7個)
- ・芽付きが厚くならないよう適正数に達したら、すみやかにラッカサンを外してください。ラッカサンを外したら、徐々に網の水位を高くしてください。
- ・健全なノリ芽を育てるため、十分な干出を与えてください。

3 海況(17日満潮時・右表)

水温：平均22.5℃と、平年より0.7℃高めでした。

比重：平均18.6でした。

栄養塩：平均26.1マイクロ(μg・at/L)でした。

プランクトン：主な種類は、珪藻(ケイトネ、コシゲイカス)、動物でした。

10月17日(旧暦22日)満潮時の海況

漁場名	調査点	水温(℃)	比重	栄養塩(μg・at/L)	プランクトン(cc/100L)
4号	1	22.3	13.5	42.8	0.3
6(2)号	12	22.2	16.4	32.3	-
七つはぜ	11	22.5	19.1	19.7	0.2
よりあわせ	A	22.1	13.5	44.1	-
えどなかつ	2	22.1	16.1	35.4	-
にしのかつ	3	22.1	16.1	34.7	0.2
たかつ	4	22.5	19.1	18.1	-
せいどまり	B	22.5	20.1	17.3	0.6
13号	10	22.5	17.8	25.5	-
20号	9	22.4	18.0	24.9	0.1
24号	8	22.6	19.5	19.6	-
ひゃつかん	5	22.7	20.2	13.4	0.4
22(1)号	6	22.5	20.1	19.2	-
25号	7	22.8	20.8	16.4	0.1
33号	16	22.8	22.0	14.1	-
43号	13	22.9	20.6	21.0	0.0
43号	14	22.5	20.4	27.1	-
44号	15	22.7	20.8	30.5	0.1
45号	C	22.5	19.5	39.9	-
平均		22.5	18.6	26.1	0.2

※ プランクトン沈殿量は速報値です。

研究所では、
10月22日(土)、23日(日)の9:00~12:00に検鏡を実施します。
※新型コロナウイルス感染防止のためマスクの着用をお願いいたします。

福岡県海況情報が「うみえる福岡」としてリニューアル!
HPアドレスは、umiel-fukuoka.jp

