

ノリ養殖情報 第3号

令和7年11月13日（採苗9日後）
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1 養殖概況

- ・現在、大割展開、網洗いが行われています。

2 海況（13日満潮時・右表）

水温：平均17.9℃と、平年より1.0℃高めでした。

比重：平均21.9でした。

栄養塩：平均8.3マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、珪藻（シラデイカス）でした。

3 ノリ芽検診の結果（11日研究連合会：網糸124本）

- ・芽付きは「適正」が約3割、「厚め」～「厚すぎ」が約7割でした。
- ・最大細胞数は82細胞（0.3mm）、最大細胞数の平均は32細胞（0.2mm）と平年並でした（平年に比べて幅広気味の葉体です）。
- ・色調は全て正常でした。
- ・二次芽の着生は、認められませんでした。
- ・芽イタミは、「なし」が82%、「軽症」が16%、「中症」が2%でした。
- ・症状は、すべて「死細胞」でした。
- ・網汚れは全体的に少なく、一部で付着珪藻とボドが確認されました。

4 今後の管理

- ・二次芽の着生促進と健全な冷凍網の入庫に向け、適度な干出、網洗いを行ってください。
- ・干出時間は、昼間の干潮で2～3時間を目安としてください。
- ・網の水位は、14日まではハラで2.0m、15日以降はハラで1.7mを目安とし、潮の引き具合、重ね枚数、天候等に応じて調節してください。
- ・栄養塩の少ない状態が続いています。展開を行う場合は岸寄り漁場から行ってください。

- ・次回の調査は11月17日(月)に行う予定です。

11月13日（旧暦24日）の海況

漁場名	調査点	水温 (℃)	比重	栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at/L}$)	プランクトン (cc/100L)
4号	1	17.3	17.9	21.9	0.7
6（2）号	12	17.4	20.3	13.3	-
七つはげ	11	17.6	22.5	4.0	0.7
よりあわせ	A	17.3	19.2	18.2	-
えどなかつ	2	17.5	20.4	13.3	-
にしのつ	3	17.6	20.9	10.8	0.7
たかつ	4	18.1	21.9	7.2	-
せいどまり	B	17.8	21.2	8.7	0.5
13号	10	17.2	21.0	8.9	-
20号	9	17.6	22.5	3.7	0.8
24号	8	17.9	22.6	4.6	-
ひやつかん	5	17.5	22.9	2.8	0.5
22(1)号	6	18.6	23.1	4.2	-
25号	7	18.4	23.5	3.8	0.7
33号	16	18.7	23.5	6.5	-
43号	13	18.3	23.4	8.4	0.7
43号	14	17.6	23.0	7.9	-
44号	15	18.9	23.5	4.4	0.8
45号	C	19.1	23.6	4.2	-
平均		17.9	21.9	8.3	0.7

※プランクトン沈殿量は速報値です