

## 1 養殖概況

- ・現在、5回目の摘採、網の撤去が行われています。
- ・全体の6割程度の網が撤去されています。

## 2 海況（16日満潮時・右表）

- 水温：平均9.8℃と、平年並みでした。  
比重：平均22.0でした。  
栄養塩：平均2.0マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。  
プランクトン：主な種類は、珪藻（リゾリニア、キトセム）でした。

## 3 ノリの病害など（16日調査・右表）

- ・アカは5調査点で確認され、重度が3点、中度が1点、軽度が1点でした。
- ・付着細菌は4調査点で確認されました。
- ・ツボは確認されませんでした。
- ・ヒアカは8調査点で確認されました。
- ・色落ちは15調査点で確認され、重度が10点、中度が3点、軽度が2点でした。

## 4 今後の管理

- ・今後も生産を継続していくために、網の管理を怠らないようにしてください。
- ・網の高さはハラで2.5m（吊り口2.7m）以上を目安としてください。
- ・活性処理を行う場合は、処理液の再利用を行い、廃液は必ず陸上で処分してください。海上への投棄は厳禁です。

## 1月16日（旧暦17日）の海況

漁場名	調査点	水温 (°C)	比重	栄養塩 ( $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ )	プランクトン (cc/100L)	アカ	色落ち	葉長 (cm)
4号	1	8.2	16.5	21.9	4.8	○	●	12
6(2)号	12	10.1	22.5	0.0	-	○	▲	12
七つはげ	11	10.0	22.6	0.0	7.0	★	▲	10
よりあわせ	A	8.2	17.7	13.2	-	○	○	2
えどなかつ	2	9.4	22.0	0.8	-	-	-	-
にしのかつ	3	9.2	21.6	1.5	3.6	●	★	10
たかつ	4	9.9	22.1	0.0	-	○	★	12
せいどまり	B	9.9	22.5	0.0	18.5	-	-	-
13号	10	10.0	22.6	0.0	-	○	★	12
20号	9	10.1	22.6	0.0	9.9	○	★	10
24号	8	10.0	22.5	0.0	-	○	★	30
ひゃっかん	5	10.1	22.4	0.0	12.8	-	-	-
22(1)号	6	10.2	22.7	0.0	-	★	★	30
25号	7	10.2	22.7	0.0	5.8	○	★	22
33号	16	10.3	22.8	0.0	-	★	★	12
43号	13	10.2	23.0	0.0	15.2	○	★	15
43号	14	10.1	22.6	0.0	-	○	●	15
44号	15	10.1	23.1	0.0	9.8	▲	▲	12
45号	C	10.1	23.1	0.0	-	○	★	25
平均		9.8	22.0	2.0	9.7	5/16地点	15/16地点	15

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの感染、色落ちの程度：○感染なし又は良好、●軽度、▲中度、★重度又は大量感染