

ノリ糸状体情報 第1号

令和7年6月16日
福岡県水産海洋技術センター有明海研究所

1. 糸状体の生育状況

6月9日に計66軒の培養場を巡回しました。

糸状体の生育状況をA（良好）、B（普通）、C（遅れ気味）で評価した結果、A：29%、A～B：27%、B：27%、B～C：15%、C：2%で、概ね順調に生長していました。

2. 病気・生理障害

現在のところ病気、障害等はみられていません。

3. 今後の管理

九州北部は6月8日頃梅雨入りしています。

海水を確保する際は、下表を参考にして、必ず比重が十分に高いことを確認してください。

また、梅雨時期は、日照不足の影響で、生長不良などのトラブルが発生しやすくなります。下表を参考にして、適切な管理を行ってください。

表 カキ殻糸状体の管理方法

項目	6月	7月	8月
水温	28℃を超えない		25～28℃
現場比重 (水温)	23～21 (～28℃) 蒸発して減った分は水道水を追加する		22～21 (25～28℃)
平面培養 明るさ (ルックス) 垂下培養	500～800 1000～1500	500 1000	800 1500
	夜は真っ暗にする		
水換え	月に一度		盆以降は中止
栄養剤	海水交換時に規定量入れる		最終水換え時は2倍量