

・摘採を急いでください！！

1 養殖概況

- ・冷凍網の入庫はほぼ終了し、一部の漁場で初摘採が開始されています。

2 海況（21日満潮時・右表）

水温：平均18.5℃と、平年より2.8℃高めでした。

比重：平均22.0でした。

栄養塩：平均13.8マイクロ（ $\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$ ）でした。

プランクトン：主な種類は、夜光虫、珪藻（コシダイカサ）でした。

3 ノリの生長（21日調査・右表）

- ・アカは4調査点で確認され、重度（肉眼視サイズ+顕微鏡サイズ）が1点、軽度（顕微鏡サイズ）が3点でした。
- ・ツボは確認されませんでした。
- ・ヒアカは19調査点中6点で確認されました。
- ・色調は良好でした。

4 今後の管理

- ・水温が高いため、今すぐ摘採を開始しないと、急速にアカの感染が拡大、重症化します。
- ・23～26日は干潮位の高いカラマです。速やかに摘採し、この期間は網が軽くなるようにしてください。
- ・網の高さはハラで2.5m（吊り口2.8m）以上を目安とし、ノリの生長や乾き具合に応じて調整してください。

11月21日（旧暦21日）の海況

| 漁場名 | 調査点 | 水温 (℃) | 比重 | 栄養塩 ($\mu\text{g}\cdot\text{at}/\text{L}$) | プランクトン (cc/100L) | アカ | 葉長 (cm) |
|--------|-----|-----------|------|---|---------------------|--------|------------|
| 4号 | 1 | 17.9 | 19.4 | 24.0 | 0.9 | ○ | 23 |
| 6(2)号 | 12 | 19.3 | 22.4 | 10.3 | - | ○ | 27 |
| 七つはぜ | 11 | 19.0 | 22.6 | 10.9 | 1.3 | ○ | 20 |
| よりあわせ | A | 17.0 | 19.3 | 27.0 | - | ○ | 10 |
| えどなかつ | 2 | 18.3 | 22.0 | 13.8 | - | ○ | 20 |
| にしのみつ | 3 | 17.9 | 21.6 | 15.8 | 0.5 | ○ | 40 |
| たかつ | 4 | 18.2 | 21.6 | 14.2 | - | ○ | 20 |
| せいどまり | B | 18.3 | 21.6 | 14.2 | 0.6 | ○ | 40 |
| 13号 | 10 | 17.8 | 21.8 | 11.5 | - | ● | 50 |
| 20号 | 9 | 18.4 | 22.7 | 10.2 | 0.4 | ● | 30 |
| 24号 | 8 | 18.1 | 22.2 | 11.6 | - | ○ | 30 |
| ひゃっかん | 5 | 18.6 | 22.2 | 13.2 | 1.3 | ○ | 40 |
| 22(1)号 | 6 | 19.0 | 22.5 | 12.1 | - | ● | 45 |
| 25号 | 7 | 19.1 | 23.0 | 9.4 | 0.6 | ★ | 40 |
| 33号 | 16 | 19.1 | 22.3 | 11.6 | - | ○ | 50 |
| 43号 | 13 | 19.1 | 23.1 | 10.6 | 0.3 | ○ | 45 |
| 43号 | 14 | 17.2 | 22.0 | 24.5 | - | ○ | 50 |
| 44号 | 15 | 19.2 | 23.1 | 9.6 | 0.4 | ○ | 35 |
| 45号 | C | 19.3 | 22.7 | 8.7 | - | ○ | 23 |
| 平均 | | 18.5 | 22.0 | 13.8 | 0.7 | 4/19地点 | 34 |

※プランクトン沈殿量は速報値です。

アカの感染の程度：○感染なし、●軽度、▲中度、★重度または大量感染